

Patienteninformation

Nur zur Abgabe an Patient:innen, denen Oxybutyninhydrochlorid-Lösung zur intravesikalen Anwendung verordnet wurde.


Wichtige Information zur Fertigspritze:

Wir haben intensiv daran gearbeitet, die Anwendung der Fertigspritze weiter zu verbessern und freuen uns, Ihnen unsere Produktweiterentwicklung vorzustellen:

Ab sofort benötigen Sie keinen Stufenkegeladapter mehr und können die Fertigspritze mit Instillationslösung direkt mit dem Katheter verbinden.

Auf den folgenden Seiten haben wir die vereinfachte Anwendung für Sie zusammengefasst.

Wie funktioniert die Instillation?



Verschreibt Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein Arzneimittel zur Instillation in einer Fertigspritze, erhalten Sie **ein Rezept für die Spritze mit Instillationslösung**.

Wie bereiten Sie die Instillation vor?


Legen Sie alles, was Sie für die Instillation benötigen, vor der Katheterisierung bereit:

- Fertigspritze
- Desinfektionsmittel
- Katheter und weitere Materialien zur Katheterisierung

Vor der Instillation sollte die Blase vollständig über einen Katheter entleert worden sein. Achten Sie darauf, die Spritze nicht direkt anzufassen, damit diese steril bleibt. Wir empfehlen Ihnen, die Spritze vor der Katheterisierung vorzubereiten.



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere **Patient:innen-Hotline unter: +49 221 791014160**
Geschäftszeiten: Mo.–Fr. 8–18 Uhr




Die folgende Anleitung finden Sie auch als Video unter www.farco.de/produkte/instillations-therapie


Anleitung zur Handhabung der Fertigspritze

**Vor
Entfernen der
Verschlusskappe:**


**Druckpunkt durch
Eindrücken oder durch
kurzes Zurückziehen
der Kolbenstange
lösen**




1) Desinfizieren Sie sich die Hände, wie auf der Verpackung Ihres Desinfektionsmittels angegeben. Öffnen Sie die Verpackung der **Fertigspritze** an der dafür markierten Stelle.




2) Nehmen Sie die Fertigspritze aus der Verpackung. Entfernen Sie die Verschlusskappe durch leichtes Drehen und legen Sie die Fertigspritze zurück in die Verpackung.




3) Tipp: Wurde Ihnen weniger als die in der Spitze befindliche Menge verordnet, spritzen Sie die nicht benötigte Menge vor der Instillation heraus. Legen Sie die Fertigspritze zurück in die Verpackung.




4) Desinfizieren Sie Ihre Hände und beginnen Sie mit der Katheterisierung. (Eine Anleitung finden Sie unter www.farco.de/isk).




5) Entleeren Sie Ihre Blase vollständig über den Katheter und stellen Sie sicher, dass sich der Katheter noch in der Blase befindet, ehe Sie mit dem Instillieren beginnen.



6) Nehmen Sie die Fertigspritze wieder aus der Verpackung und verbinden Sie diese mit dem Katheter.



7) Instillieren Sie den Inhalt der Fertigspritze in die Blase, indem Sie den Kolben der Spritze herunterdrücken. Entfernen Sie die Fertigspritze zusammen mit dem Katheter zwecks Entsorgung.



8) Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. Entsorgen Sie die Arzneimittel zur Schonung der Umwelt nicht im Abwasser.